

Til pasienter som får immediatprotese

Tidligere var det vanlig at pasientene gikk tannløse i tre måneder før tannlegen kunne få fremstilt en protese.

Ved at det nå fremstilles en immediat (umiddelbar) protese har pasienten unngått en slik tannløs periode.

Til gjengjeld får pasienten kanskje en noe hard overgangstid før sårene, som oppstår etter at tennene er trukket, har grodd. Sårene tilheler likevel bedre med, enn uten protese. Protesen ligger som en bandasje på sårene.

Protesen skal ikke tas ut før tannlegen gjør det på avtalt kontroll etter to dager.

Ikke forsøk å reparer noe på egen hånd.

Det tar tid før muskulaturen er fortrolig med ny protese, og det kan bli såre punkter og gnag under og i kantene av protesen. Tannlegen vil kunne hjelpe med disse plagene gjennom å justere på protesen.

Til å begynne med kan man få brekningsførmelser og ekstra mye spytt i munnen. Dette er en naturlig reaksjon som pleier å gå over etter en dag eller to.

Tygg ikke med protesen den første uken. Innta kun flytende føde. Begynn deretter med små matbiter og tygg forsiktig. Tygg på høyre og venstre side samtidig.

De første ukene skal protesen bæres om natten. Senere bør protesen tas ut og ligge i vann natten over.

I løpet av noen måneder vil det sannsynligvis ha skjedd et større eller mindre svinn av kjeveben. Protesen kan glippe og kjennes for romslig. Da må protesen føres, eller kanskje til og med gjøres om. Dette er en kostnad som må dekkes av pasienten.